

SoftAcid®IV+ E flüssig

Naturprodukte auf höchstem Niveau

Ergänzungsfuttermittel

Sichere Handhabung - Kompromisslose Wirkung

Nur mit diesem Siegel ist es ein Original!

Dosierung und Verabreichung für Brief- u. Rassetauben, Kleingeflügel und Kaninchen

SoftAcid®IV+ E ist eine **patentierte Mischung** aus organischen Säuren und modifizierten Ligninsulfonsäuren. **SoftAcid®IV+ E** wird nicht als Gefahrgut eingestuft. Die antibakteriellen Eigenschaften von **SoftAcid®IV+ E** entsprechen denen von Ameisensäure oder Ameisensäure-Propion-Säure-Gemischen.

Verabreichen Sie **SoftAcid®IV+ E flüssig** in den ersten 8 Tagen wie folgt:

1 ml auf 3 ltr. Wasser zur Gewöhnung, 3 Tage

1 ml auf 2 ltr. Wasser zur Vorbeugung, 5 Tage

In der Folgezeit verabreichen Sie die Konzentration von 1 ml auf 2 l Wasser 3x wöchentlich oder nach den Vorgaben der Wasseruntersuchung der Tierärztlichen Praxis Pfützner in Schweinitz.

Wurde die Konzentration von SoftAcid®IV+ E durch den Tierarzt Herrn Pfützner festgestellt, übernehmen Sie diese Empfehlung und Vorgehensweise an 3 Tagen in der Woche. (s. auch Seite 3 des Produktkataloges) Mit dieser Empfehlung und Dosis wird eine optimale Prophylaxe gegen die Vermehrung der Trichomonaden durchgeführt.

Sie können die Tiere bei ernährungsbedingten Darmbeschwerden unterstützen, indem von der Konzentration 1,0-1,5 ml auf 1 ltr. Wasser 10-15 ml direkt in den Kropf gespült wird (bei den sehr kleinen Tieren selbstverständlich nicht diese starke Konzentration).

Bei jeder ernährungsbedingten Stresssituation und ernährungsbedingten Mängeln in der Absetzungsphase, vor und nach der Ausstellung, Fütterungswechsel usw. empfehlen wir 1-1,5 ml **SoftAcid®IV+ E** auf 1 Ltr. Wasser.

Fügen Sie dem Badewasser ca. 3 ml auf 10 l zu. Milben und Federlinge haben keine Chance mehr.

Nur für Brieftauben:

Dosierung während der Reise a. als 2. Tränke nach der Rückkehr (z.B. Sonntag abends und Montag morgens oder Samstag abends und Sonntag morgens) b. 1-2 Tage vor dem Einsatz (z.B. Donnerstag abends und Freitag morgens bzw. Mittwoch abends und Donnerstag morgens). Bis zum Einsetzen haben die Tauben noch genügend Zeit, evtl. den Wasserhaushalt zu regulieren.

Verkaufspreise:	9,80 €	für	150 ml
	17,50 €	für	250 ml
	30,20 €	für	500 ml
	53,00 €	für	1000 ml


Adapter, Dosierungsspritze und Spritze mit Schlauch für die Kropfspülung erhalten Sie gratis.

Ameisen flüchten, wenn in die Gänge und Löcher eine Konzentration von 10 ml SoftAcid®IV+ E auf 1 l Wasser gesprüht wird.

Bei einem Auftragswert unter 30,00 € erfolgt ein Aufschlag von 4,00 € für Porto u. Verpackung.

Das einzige wirksame Mittel auf Naturbasis bei den starken Darmproblemen der Jungtauben

**Bockholter Weg 44 · 49757 Werlte · Telefon 0 59 51/99 05 05 · Fax 0 59 51/99 05 06
www.teekontor-werlte.de · e-mail: info@teekontor-werlte.de**



Nur mit
diesem Siegel
ist es ein
Original!

Naturprodukte auf höchstem Niveau

Wichtige Hinweise zur Verabreichung von SoftAcid®IV+ E in flüssig bei starken Darmproblemen der Brief- und Rassejungen (sog. Jungtaubenkrankheit)

Zuchtvorbereitung

8 - 10 Tage vor der Anpaarung wird dem gesamten Bestand 3 Tage lang SoftAcid®IV + E - 1 ml auf 1 Liter Wasser - verabreicht. Auch das Körnerfutter kann mit der flüssigen Konzentration angefeuchtet werden. Pilze, Sporen und Milben im Futter werden somit eliminiert. Das Futter wird dann mit Xentasan Pulver abgebunden. Danach wird dem täglichen Futter bis zur Eiablage stabilisierte Reiskleie untergemischt - ca. 10 g mit Wasser zu einem Brei anrühren und unter 1 kg Körnerfutter mischen. Auch in diesen Brei kann Xentasan Pulver eingemischt werden.

Befruchtungs- und Schlupfprobleme bei den Tieren kennen diese Züchter nicht mehr. Nach dem Schlupf der Jungtiere erhalten die Eltern bis zum Absetzen täglich stabilisierte Reiskleie und Xentasan Pulver über das Körnerfutter, sowie 2 x wöchentlich SoftAcid®IV+ E, 1 ml auf 2 ltr. Wasser.

Vor- und Nachbereitung der Tauben für die Ausstellung, sehr wichtig für alle Rassetaubenzüchter.

Der gesamte Bestand erhält 8 Tage vor der Ausstellung täglich **JTK Pulver** in das Futter. Am besten mischen Sie abends vorher einen Brei und rühren diesen Brei, evtl. mit **Mineralith**, in das Futter. Am nächsten Tag ist alles knochentrocken und die Tiere fressen dann das Futter sehr gerne. Der gesamte Bestand erhält ebenfalls **täglich SoftAcid®IV + E** in der Konzentration 1 ml auf 2 ltr. Wasser. Die Ausstellungstiere erhalten beim Einkorben von dieser Konzentration 10 ml und **1 Kapsel Colostrum Pulver oder JTK Pulver** direkt in den Kropf. Sprühen Sie die Ausstellungstiere unter jeden Flügel **INSECTICIDE 2000**. Es ist geruchlos und tötet rote Vogelmilben, nordische Milben, Flöhe, Federlinge, Zecken usw. ab.

Die Vorgehensweise wird nach der Ausstellung in umgekehrter Reihenfolge wiederholt.

Wir können uns nicht mehr vorstellen, dass Sie von der Ausstellung noch kranke Tiere im Schlag haben.

Jungtaubenkrankheit

Bei Ausbruch der JTK nehmen Sie bitte sofort mit uns Kontakt auf. Sie erhalten für Ihren Bestand eine ausführliche Dosierungsanleitung mit einem Stabilisator.

Brieftauben

Gehen Sie davon aus, dass Jungtauben bei jedem Flug irgendein Problem mitbringen. Vor und nach jedem Flug muss das Immunsystem unterstützt werden. Sollten bereits die Darmprobleme vorüber sein, bekommen Sie keine Garantie, dass die Tauben in 4 Wochen nicht wieder davon befallen werden. Haben Sie keine Angst mehr vor diesen Problemen. Gehen Sie nach Plan vor und nehmen eventuell telefonisch Kontakt auf.